



Vicks Tosse "7,33 mg pastiglie"

PRIMA DELL'USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta medica ma va usato correttamente per assicurare l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.
- Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

VICKS TOSSE "7,33 mg Pastiglie" DESTROMETORFANO BASE 18 PASTIGLIE Con Miele

COMPOSIZIONE

Una pastiglia contiene:
PRINCIPIO ATTIVO: Destrometorfano base 7,33 mg.
ECCIPIENTI: Saccarosio, Glucosio, Miele, Mentolo, Aroma Miele, Aroma Caramello.

COME SI PRESENTA

VICKS TOSSE "7,33 mg Pastiglie" si presenta in forma di pastiglie da 3,60 g. Ogni confezione contiene 3 blister in materiale plastico, ognuno da 6 pastiglie, per un totale di 18 pastiglie.

CHE COSA È?

VICKS TOSSE "7,33 mg Pastiglie" è un calmante della tosse per uso orale.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

PROCTER & GAMBLE S.r.l. - Via Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma.

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

PROCTER & GAMBLE Manufacturing GmbH Procter & Gamble Strasse 1, 64521 - Gross Gerau, Germania

PERCHÉ SI USA

VICKS TOSSE "7,33 mg Pastiglie" si usa per calmare la tosse.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità (allergia) verso i componenti del prodotto, asma, presenza di malattie gravi a carico dell'apparato respiratorio. È opportuno consultare il medico nel caso in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato. Bambini di età inferiore ai 6 anni.

COSA FARE DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

VICKS TOSSE "7,33 mg Pastiglie" durante la gravidanza e l'allattamento deve essere usato solo dopo aver consultato il medico. Inoltre consultare il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

Somministrare con cautela nei soggetti con alterata funzionalità del fegato.

QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Esiste la possibilità di interazione con farmaci antidepressivi (anti-MAO), per cui si sconsiglia l'uso durante o nelle due settimane successive al trattamento con tali farmaci. È opportuno evitare, durante la terapia, l'assunzione di alcool. Se state usando altri medicinali chiedete consiglio al vostro medico o farmacista.

E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Il prodotto può dare sonnolenza, di ciò devono tenere conto coloro che potrebbero condurre autoveicoli o compiere operazioni richiedenti un'elevata attenzione.

Il prodotto contiene saccarosio (2,1 g per ogni pastiglia), di ciò si tenga conto in caso di diabete o di diete ipocaloriche. Il medicinale non è controindicato per i soggetti affetti da malattia celiaca.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico. Adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni: 2 pastiglie ogni 6-8 ore da sciogliere lentamente in bocca.

Bambini da 6 a 11 anni: 1 pastiglia ogni 6-8 ore da sciogliere lentamente in bocca. Queste dosi possono essere ripetute fino ad un massimo di 8 pastiglie al giorno. Se dopo breve periodo di trattamento non si ottengono risultati apprezzabili, consultare il medico.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

L'assunzione di una dose eccessiva potrebbe causare vertigini, eccitamento, confusione mentale e disturbi gastrointestinali. Dosi molto alte potrebbero causare eccitazione, confusione mentale e depressione respiratoria (grossa difficoltà a respirare).

In seguito all'assunzione di dosi eccessive e molto alte il trattamento può richiedere la lavanda gastrica e la cura dei sintomi specifici, per cui in caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva e molto alta di VICKS TOSSE "7,33 mg Pastiglie" avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Possono manifestarsi eccitazione, confusione mentale, disturbi gastrointestinali, sonnolenza e vertigini. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno

consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza, riportata sull'etichetta esterna e interna, si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Revisione del foglio illustrativo: Maggio 2000